

# Détruisez l'Ambroisie avant qu'elle ne soit en fleurs

## Pourquoi ?

### Les pollens d'Ambroisie

peuvent provoquer des réactions allergiques en fin d'été :

- rhinites
- conjonctivites
- asthme
- laryngites
- urticaire
- eczéma



### L'Ambroisie pousse :

- sur les remblais et chantiers.
- les terres à l'abandon.
- les lotissements.
- dans les cultures.

## Agissez !

Ses fleurs sont vert pâle à jaune et se dressent en épis



AMBROISIE EN FLEUR

La plante doit être **éliminée**

- par l'arrachage (avec port de gants).
- par un fauchage (à 10 cm), de préférence avant floraison, fin juillet répété fin août.
- en empêchant son installation par végétalisation avec des plantes non allergisantes (trèfle, luzerne, ...).

## Informez-vous !

[www.ambroisie.info](http://www.ambroisie.info)

[www.pollen.fr](http://www.pollen.fr)

## Reconnaissez-la



**Ne la confondez pas  
avec  
l'armoise vulgaire !**

Observatoire des ambroisies, d'après DDAS Rhône



ARMOISE VULGAIRE EN FLEUR

**Observatoire  
des  
Ambroisies**

Contact: [observatoire.ambroisie@diijon.inra.fr](mailto:observatoire.ambroisie@diijon.inra.fr)

# Ambroisie

attention

# Allergies !



AMBROISIE A FEUILLES D'ARMOISE

Tous concernés  
Chacun doit agir !

	Ambroisie	Armoise
<b>TIGE</b>	Striée Couleur verte et aubergine Couverte de poils blancs Assez souple	Striée Couleur verte et aubergine Pas de poils Raide
<b>FEUILLE</b>	<b>Couleur :</b> les deux faces : vert clair	<b>Couleur :</b> • face supérieure : vert foncé • face inférieure : blanchâtre
	<b>Forme :</b> profondément divisée jusqu'à la nervure	<b>Forme :</b> divisée mais sans aller jusqu'à la nervure
<b>FLEUR</b>	Grappes de petites fleurs situées au sommet des tiges, couleur vert-jaune avant éclosion, jaune après éclosion Très pollinisante	Grappes de petites fleurs, à la base des feuilles de fin de tige, couleur vert-gris avant éclosion, blanche après éclosion Faiblement pollinisante
		
	<b>FEUILLE D'AMBROISIE</b>	<b>FEUILLE D'ARMOISE</b>